

Koiranomistaja, varo sinilevää!

Onko koira rantapäivän jälkeen levoton ja oksentelee, huojuu ja tärisee? Ota siinä tapauksessa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, sillä kyseessä voi olla sinilevämyrkytys. Sinilevän myrky voi johtaa koiran menehtymiseen jopa tunnin kuluessa.



Koirien sinilevämyrkytys ei onneksi ole kovin yleinen, mutta muutamia koiria menehtyy vuosittain sen seurauksena. Ole siis tarkkana, että koira ei ui sinilevävedessä tai juo vettä, jossa on tai epäillään olevan sinilevää.

Oireet

Sinilevämyrkytyksen oireet näkyvät nopeasti, usein jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. Oireiden voimakkuuteen vaikuttavat koiran ikä, sinilevän määrä ja kuinka paljon koira on syönyt ennen uimista.

Ensioireita ovat levottomuus, tärinä ja oksentaminen. Koira on silloin vietävä eläinlääkäriin välittömästi.

Seuraavaksi koira saa kramppeja, huojuu, menettää tasapainonsa ja saattaa kaatua maahan pääsemättä ylös omin voimin. Myrkytys vaikuttaa maksaan ja munuaisiin aiheuttaen koiralle virtsatietulehduksen, keltataudin ja pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan.

Jos koira tuodaan eläinlääkäriin välittömästi, koira voidaan vielä pelastaa. Soita eläinklinikalle matkalla ja ilmoita tulostanne. Koiran selviytyminen voi usein olla minuuteista kiinni.

Vie koira välittömästi eläinlääkäriin, jos koiralla on seuraavia oireita uimisen tai rantapäivän jälkeen:

- Levottomuus
- Tärinä tai vapina
- Oksentaminen
- Huojuminen
- Kramppeja

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kattavia vakuutuksia kissoille ja koirille.

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. Käyttämämme kuvia saa käyttää julkaisuissa - mikäli käytätte muuta kuvaa toivomme, että kuva ei sisältäisi brakykefaalisia/lyhytkalloisia koirarotuja tai sairaita lemmikkejä.