

## Älä lievitä lemmikin kipua ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä

Agria Eläinvakuutus muistuttaa, että lemmikille ei saa antaa ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä, sillä ne voivat kivun lievittämisen sijaan aiheuttaa eläimelle vaarallisen myrkytystilan. Yleiset ihmisten kipuja lievittävät lääkeaineet kuten ibuprofeeni, asetyylisalisyylihappo ja parasetamoli eivät sovi lemmikeille.



Koiran ja kissan elimistössä lääkeaineet hajoavat eri tavoin kuin ihmisen elimistössä. Lääkeaine voi hajota huomattavasti hitaammin kuin ihmisen elimistössä tai se ei hajoa lainkaan. Lääkeaine voi myös muuttua lemmikin maksassa hengenvaaralliseksi yhdisteeksi.

Tavallisia myrkytyksen oireita lemmikillä ovat oksentelu ja ripuli, tärinä, hengitysvaikeudet ja kuolaaminen. Oireet ja niiden voimakkuus riippuu lääkeaineesta sekä syötyjen lääkkeiden määrästä.

**Kissat ovat erityisen herkkiä**

Kissat ovat erityisen herkkiä ihmisille tarkoitetuille särkylääkkeille. Kolme yleisintä kissalle ja koiralle vaarallista lääkeainetta ovat parasetamoli, asetyylisalisyylihappo ja ibuprofeeni, mutta suurissa määrissä syötynä mikä tahansa lääkeaine voi olla lemmikille vaarallinen.

Koira- ja kissataloudessa kaikki lääkeaineet - myös eläimille itselleen tarkoitetut lääkkeet - on hyvä säilyttää lemmikkien ulottumattomissa.

### **Lemmikeille sopimattomat yleiset lääkeaineet**

**Ibuprofeeni** on vaikuttava aine muun muassa Buranassa ja Ibumaxissa. Ibuprofeenin yliannostus aiheuttaa koiralle tavallisimmin ruuansulatuskanavan oireita kuten oksentelua, ripulia, ulosteen verisyyttä, vatsakipua ja mahdollisesti mahalaukun ja pohjukaissuolen haavaumia. Suuret annokset voivat aiheuttaa myös keskushermosto-oireita. Jos kissa saa ibuprofeenimyrkytyksen, eläin on usein sekava, sen uloste on veristä, ja pahimmassa tapauksessa kissa voi menehtyä.

**Parasetamoli** on vaikuttava aine muun muassa Panadolissa. Parasetamoli voi suurena kerta-annoksena aiheuttaa koiralle myrkytysoireita ja maksavaurion. Kissalle myrkytys voi johtaa anemiaan ja jopa kissan menehtymiseen, jos kissa ei saa oikeanlaista hoitoa ajoissa.

**Asetyylisalisyylihappo** on vaikuttava aine muun muassa Asperinissa ja Disperinissä. Asetyylisalisyylihappovalmisteet voivat aiheuttaa koiralle muun muassa mahalaukun limakalvovaurioita, oksentelua, ripulia ja syömättömyyttä. Kissat ovat erityisen herkkiä asetyylisalisyylihapolle, koska lääkeaineen poistuminen kissan elimistöstä on hidasta. Pahimmillaan hoitamaton myrkytys voi johtaa kissan menehtymiseen.

### **Milloin eläinlääkəriin?**

Jos sinulla on pienikin epäily, että lemmikkisi on syönyt ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä tai lemmikillä ilmenee myrkytyksen oireita, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkəriin. Myrkytys voi muuttua hetkessä hengenvaaralliseksi ja siksi lemmikin tulee saada oikeanlaista hoitoa mahdollisimman pian.

Yritä selvittää, mitä lemmikkisi on syönyt ja ota mahdollisuuksien mukaan lääkepakkaus tai tuoteseloste mukaan eläinlääkəriin.

Monet myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyvät heti tai muutamissa tunneissa, mutta esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä vasta päivien tai viikkojen kuluttua.

### **Agria Eläinvakuutus**

viestinta@agria.fi

---

**[Agria Eläinvakuutus](#)** on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille.

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina [Agria Eläinvakuutus](#).